

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

# 防己黄耆湯<sup>㊂</sup>

(ぼういおうぎとう)

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。：むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症：肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ

### 【用法・用量】

大人(15才以上)は1包(1日量)につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮詰め、紙袋とともに煎じかすを取り去り、3~2回に分けて食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人(15才未満4才以上)は下記の量を1日3回に分けて服用して下さい。

年齢	1包(1日量)	1日服用回数
	煎じ液	
大人(15才以上)	全量	3~2回に分けて
15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて
7才未満4才以上	1/2量	
4才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】【本品1包(1日量) 18.5g中】

日本薬局方ボウイ …… 5.0g 日本薬局方タイソウ …… 3.0g  
日本薬局方オウギ …… 5.0g 日本薬局方カンソウ …… 1.5g  
日本薬局方ビャクジュツ …… 3.0g 日本薬局方ショウキョウ …… 1.0g

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



【製造販売元】  東洋漢方製薬株式会社  
〒584-0022 大阪府富田市中野町東2丁目1番16号

【問い合わせ先】本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」  
電話 0120-00-1040  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931

【発売元】



株式会社 **タキザワ漢方**  
ホームページ: takizawa.asia **タキザワ漢方**