

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

當帰芍薬散料 ㊸

(とうきしゃくやくさんりょう)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 胃腸の弱い人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え、しもやけ、むくみ、しみ。

【用法・用量】

大人(15才以上)は1包(1日量)につき水400mLを加えあまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともに煎じかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人(15才未満4才以上)は同様に煎じて食間空腹時に温服して下さい。

年齢	1包(1日量) 煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全量	3~2回に分けて
15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて
7才未満4才以上	1/2量	
4才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】本品1包(1日量)24.0g中

日本薬局方トウキ……… 3.0g 日本薬局方ブクリョウ… 4.0g
日本薬局方センキュウ… 3.0g 日本薬局方ビャクジュツ… 4.0g
日本薬局方ジャクヤク… 6.0g 日本薬局方タクシャ… 4.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



【製造販売元】  東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号

【問い合わせ先】本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0120-00-1040
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931

【発売元】



株式会社 **タキザワ漢方** 廠
ホームページ: takizawa.asia **タキザワ漢方** 